



Ospedale Mater Salutis - SC di Pneumologia
 Direttore Dr. Claudio Micheletto

TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA

All'atto dell'esecuzione del test dovranno essere sospesi, compatibilmente con il quadro clinico, i seguenti farmaci:

β_2 agonisti broncodilatatori a breve durata d'azione Fenoterolo (Dosberotec), Salbutamolo (Broncovaleas, Ventolin), etc Salbutamolo associato a steroide (Clenil compositum, Plenaer) Salbutamolo associato ad anticolinergico (Brevia)	8 ore
β_2 agonisti broncodilatatori a lunga durata d'azione Formoterolo (Atimos, Eolus, Foradil, Oxis) Formoterolo associato a steroidi (Formodual, Foster, Inuver, Symbicort, Sinestic) Salmeterolo (Arial, Salmetedur, Serevent) Salmeterolo associato a steroidi (Aliflus, Seretide)	48 ore
β_2 agonisti broncodilatatori a lunghissima durata d'azione Indacaterolo (Hirobriz, Onbrez)	48 ore
Anticolinergici a breve durata d'azione Ipratropio (Atem), Ossitropio (Oxivent)	24 ore
Anticolinergici a lunga durata d'azione Tiotropio (Spiriva)	48 ore
Cromoni a breve durata d'azione Sodio Cromoglicato (Lomudal)	8 ore
Cromoni a lunga durata d'azione Nedocromil sale sodico (Tilade)	48 ore
Antileucotrienici Montelukast (Luckasm, Montegen, Singulair) Zafirlukast (Accoleit, Zafirst)	24 ore
Antiistaminici Cetirizina (Cerchio, Formistin, Reactine, Zirtec), Levocetirizina (Xyzal), Loratadina (Clarityn, Fristamin), Desloratadina (Aerius)	3 giorni
Teofillinici per os Aminomal, Diffumal, Respicur, Theo-Dur, Theolair,	48 ore

La sospensione degli steroidi inalatori od orali non è consigliata, ma devono essere comunicate le dosi giornaliere assunte e la durata di assunzione. Qualora lo steroide sia somministrato in associazione al broncodilatatore, andranno seguite le indicazioni di sospensione relative al broncodilatatore.