



**Ospedale Mater Salutaris - UOC di Pneumologia**  
**Direttore Dr. Claudio Micheletto**

**TORACOSCOPIA MEDICA**  
**MODULO INFORMATIVO**

<b>L'esame</b>	La toracosopia medica è una tecnica che consente l'esplorazione visiva del cavo pleurico e degli organi in esso contenuti e le eventuali biopsie sulla pleura parietale. La procedura è solitamente ben tollerata dai pazienti e richiede tempi di degenza e costi intraospedalieri sicuramente ridotti rispetto alla toracosopia chirurgica. L'esame è indicato nella diagnosi e nella terapia dei versamenti pleurici recidivanti di natura indeterminata e/o neoplastici, nella patologia infettiva, nella diagnosi e stadiazione delle neoplasie polmonari.
<b>Dove</b>	SC di Pneumologia, presso il Servizio di Broncoscopia
<b>Responsabile</b>	Dr. Claudio Micheletto – tel. 0442622213
<b>Preparazione</b>	E' necessario il ricovero ospedaliero in Pneumologia dove verranno eseguiti gli esami ematologici, cardiologici, radiologici e pneumologici necessari per la selezione dei pazienti e l'individuazione delle condizioni a rischio.
<b>Esecuzione</b>	La toracosopia medica viene eseguita dopo la somministrazione endovenosa di farmaci tranquillanti e la somministrazione locale di anestetici. Gli strumenti attualmente in uso permettono l'esplorazione del cavo pleurico, della superficie del polmone e del diaframma. Gli strumenti attualmente in uso si avvalgono di fibre ottiche che consentono la trasmissione della luce nella cavità pleurica e la sua visualizzazione attraverso un monitor. Durante l'esame sono possibili procedure diagnostiche (biopsie sulla pleura parietale) e terapeutiche (insufflazione di talco intrapleurico per causare la pleurodesi tra i due foglietti pleurici).
<b>Effetti collaterali e/o complicanze</b>	Le complicanze della Toracosopia Medica sono un'evenienza rara e sono caratterizzate da: modesto (< 50 ml) sanguinamento; complicanze cardiovascolari quali bradicardia e ipotensione di modesta entità; lieve insufficienza respiratoria correggibile dalla somministrazione di O2. Un modesto enfisema sottocutaneo è relativamente frequente, se tende ad aumentare nelle ore successive l'esame andrà verificato il funzionamento del sistema di aspirazione.
<b>Standard di prodotto</b>	<u>Complicanze minori</u> (enfisema sottocutaneo, febbre, sanguinamento, dolore toracico, pneumotorace) nel 10 % dei casi <u>Complicanze maggiori</u> (empiema, polmonite, emorragia > 500 ml) nel 2.3 % dei casi. In Letteratura è riportata una percentuale di successo tra il 72-90 %
<b>Dopo l'atto sanitario</b>	Dopo l'esame il paziente manterrà il drenaggio pleurico per alcuni giorni per favorire il riassorbimento dell'aria e dovrà eseguire alcuni controlli della radiografia del torace per controllarne l'andamento. La durata media del ricovero per eseguire una toracosopia è di 12 giorni.
<b>Controindicazioni</b>	Scompenso cardiaco, grave insufficienza respiratoria, aneurisma aortico, ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia, severe coagulopatie. Prima dell'esame il Medico Endoscopista eseguirà tutti gli accertamenti opportuni per escludere le condizioni di rischio.

**TORACOSCOPIA MEDICA  
CONSENSO**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

informato sul significato della Toracosopia Medica, sulle modalità di esecuzione, sui possibili eventi avversi, dichiaro che non sussistono nessuna delle controindicazioni.

Dichiaro inoltre di aver compreso le informazioni fornite sulla esecuzione e sui rischi connessi all'esame e di **acconsentire** all'esecuzione dell'esame stesso.

Data \_\_\_\_\_ Firma del paziente \_\_\_\_\_

Firma del medico che ha fornito le informazioni \_\_\_\_\_

**NON CONSENSO**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

informato sul significato della Toracosopia Medica, sulle modalità di esecuzione e sulle controindicazioni, dichiaro inoltre di aver compreso le informazioni fornite sulla esecuzione e sui rischi connessi all'esame e di **non acconsentire** all'esecuzione dell'esame stesso.

Data \_\_\_\_\_ Firma del paziente \_\_\_\_\_

Firma del medico che ha fornito le informazioni \_\_\_\_\_

Le ricordiamo che il suo consenso è revocabile in qualsiasi momento e che un suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza per quanto riguarda la prosecuzione dell'assistenza secondo necessità. Nel caso in cui decida di revocare il suo consenso dovrà rivolgersi al personale sanitario che provvederà a registrare tale revoca e ad annullare eventuali impegni/prenotazioni già stabiliti